

Адсорбированная вакцина для профилактики дифтерии столбняка.

**Форма выпуска**

Суспензия для инъекций в:

- мультидозной упаковке (5 мл или 10 мл);
- готовых к использованию шприцах (0,5 мл);
- ампулах (0,5 мл).

**Показания**

Этот препарат является вакциной, использование которой показано взрослым, начиная с 18 лет в следующих случаях:

систематическая ревакцинация против дифтерии и столбняка. Препарат содержит сниженную дозу дифтерийного анатоксина с целью минимизации риска развития реакции гиперчувствительности;

первичная вакцинация;

угроза заболевания столбняком вследствие ранения (при необходимости проведения ревакцинации против дифтерии).

При вакцинации лиц младше 18 лет инъекция ревакцинирующей дозы инактивированной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и полиомиелита рекомендуется в 6 и 11 лет, а затем - в период между 16 и 18 годами жизни\*. Вместе с тем, адсорбированная вакцина против дифтерии и столбняка ИМОВАКС Д.Т.АДЮЛЬТ может использоваться для ревакцинации детей в случае, если профилактика полиомиелита обеспечена путем введения оральной аттенуированной противополиомиелитной вакцины.\*

\*Схема применения препаратов определяется Национальными календарями профилактических прививок.

**Противопоказания**

Данный препарат не должен вводиться в следующих случаях:

- истинная аллергия на один из компонентов вакцины;
- при повышенной температуре тела, а также остром или хроническом заболевании в стадии обострения рекомендуется отложить вакцинацию (кроме случаев, когда ее проведение абсолютно необходимо);
- реакция гиперчувствительности или неврологические расстройства вследствие предыдущего введения вакцины;

В сомнительных случаях проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

**Специальные предостережения**

Не вводить внутривенно. Перед введением убедиться, что игла не проникла в кровеносный сосуд.

Иммуносупрессивная терапия или иммунодефицит может привести к снижению интенсивности иммунного ответа на введение вакцины. В связи с этим, для проведения вакцинации рекомендуется дождаться окончания проводимого лечения или обеспечить надежную безопасность пациента. Вместе с тем, вакцинация лиц с хроническим иммунодефицитом рекомендуется, если сопутствующее заболевание не препятствует формированию хотя бы невысокого уровня антител.

**Замечания по использованию**

Использовать данный препарат с осторожностью в случае завершенной первичной

вакцинации или ревакцинации в течение предшествующих 5 лет. В сомнительных случаях необходимо проконсультироваться с Вашим врачом или фармацевтом.

**Лекарственные и другие взаимодействия**

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны. Вместе с тем, для того, чтобы избежать возможных взаимодействий с некоторыми медицинскими препаратами, необходимо систематически сообщать Вашему врачу или фармацевту о любом лечении, совпадающем по времени с вакцинацией.

**Беременность и лактация**

Использование данной вакцины у беременных женщин не рекомендуется.

**Дозировка**

Систематическая ревакцинация - каждые 10 лет 0,5 мл вакцины однократно.

Первичная вакцинация: 3 дозы по 0,5 мл с интервалом в 1 месяц.

Профилактика столбняка у лиц, входящих в группы риска: рекомендуется вакцинировать по следующей схеме:

Рана

Невакцинированный пациент или незаконченная вакцинация

Полностью вакцинированный пациент

Время, прошедшее с момента последней ревакцинации

5-10 лет

более 10 лет

Незначительная, чистая

Начать или завершить вакцинацию:

столбнячный анатоксин (0,5 мл)

Не вакцинировать

Столбнячный анатоксин (0,5 мл)

Значительная, чистая или подозрительная на инфицирование

В одно плечо: Человеческий противостолбнячный иммуноглобулин (250 ME\*)

В другое плечо: столбнячный анатоксин\*\* (0,5 мл)

Столбнячный анатоксин (0,5 мл)

В одно плечо: Человеческий противостолбнячный иммуноглобулин (250 ME\*)

В другое плечо: столбнячный анатоксин (0,5 мл\*)

Подозрительная на инфицирование

Отложенная или незаконченная чистка раны

В одно плечо: Человеческий противостолбнячный иммуноглобулин (500 МЕ\*)

В другое плечо: столбнячный анатоксин\*\* (0,5 мл)

Антибиотикотерапия

Столбнячный анатоксин (0,5 мл)

Антибиотикотерапия

В одно плечо: Человеческий противостолбнячный иммуноглобулин (500 МЕ\*)

В другое плечо: столбнячный анатоксин (0,5 мл\*)

Антибиотикотерапия

---

\* Вводить в разные участки тела, использовать различные шприцы и иглы.

\*\* Обновлять вакцинальный статус в соответствии с календарем вакцинации

**Способ введения**

Перед введением встряхнуть до образования гомогенной суспензии. С целью минимизации местных реакций, рекомендуется внутримышечное введение препарата. Вакцина может также вводиться глубоко подкожно. Не вводить внутривожно.

**Побочные реакции**

Как и любой активный препарат, данная вакцина может вызывать у некоторых людей реакции различной степени выраженности. В месте инъекции могут появляться и сохраняться в течение 1-2 дней болезненность, уплотнение или покраснение. Кроме того, может наблюдаться формирование подкожного узелка. Возможны повышение температуры тела, кожная сыпь, зуд, общее недомогание, боль в мышцах и суставах, а также головная боль. Обо всех иных нежелательных и беспокоящих Вас реакциях просьба сообщить Вашему врачу или фармацевту.