

Полисахаридная вакцина для профилактики цереброспинального менингита, вызываемого менингококками серогрупп А и С.

### **Форма выпуска**

Раствор для инъекций, получаемый путем растворения лиофилизата растворителем.

- Лиофилизат: Флакон, содержащий 1, 10 или 50 доз
- Растворитель: Шприц, содержащий 1 дозу (0,5 мл)

Флакон, содержащий 10 доз (5 мл)

Флакон, содержащий 50 доз (25 мл)

### **Показания**

Профилактика цереброспинального менингита, вызываемого менингококками серогрупп А и С у взрослых и детей с 18-месячного возраста. Вакцинация рекомендуется в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С. Длительность сохранения поствакцинального иммунитета, по имеющимся в настоящее время данным, составляет 3 года.

### **Противопоказания**

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в следующих случаях:

- Острые инфекционные заболевания.
- Прогрессирующие заболевания (острые или хронические).

Вакцина не должна использоваться у лиц, у которых ранее наблюдалась тяжелая реакция на введение данной вакцины или ее компонента. В любых сомнительных случаях проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

### **Предостережения**

Данная вакцина индуцирует иммунитет только против менингита, вызываемого менингококками серогрупп А и С и не обеспечивает защиты от гнойных менингитов иной этиологии: менингококков группы В, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* и др. Не вакцинировать детей младше 18 месяцев во внеэпидемический период. В любых сомнительных случаях проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

**Лекарственные и другие взаимодействия**

С целью предотвращения возможных взаимодействий между данной вакциной и некоторыми медицинскими препаратами, сообщите Вашему врачу или фармацевту о любом лечении, совпадающем по времени с вакцинацией.

### **Беременность и лактация**

Изучения безвредности вакцинопрофилактики менингококковой инфекции, вызываемой менингококками серогрупп А и С для беременных женщин не проводилось. Однако вакцинация в период беременности и лактации не является категорически противопоказанной и может проводиться в случае высокого риска инфицирования, т.е. в период эпидемии.

### **Дозировка**

Вакцинация проводится однократно, начиная с 18 месячного возраста.

### **Способ введения, схема применения**

Растворить лиофилизат с помощью входящего в комплект растворителя.

Вакцина вводится подкожно или внутримышечно.

Флаконы с разведенной вакциной должны быть использованы немедленно.

Если вакцина поставлена в шприце, после использования его следует уничтожить.

### **Побочные реакции**

Иногда может иметь место местная реакция, сопровождаемая гипертермией или без таковой. Гипертермия быстро проходит под действием антипиретиков. Сообщите Вашему врачу или фармацевту о любой реакции на введение данной вакцины, не описанной в настоящей инструкции.