

Пневмо 23 - полисахаридная поливалентная пневмококковая вакцина.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций: одна доза в шприцах (0,5 мл).

Показания

Профилактика инфекций пневмококковой этиологии (в частности, пневмонии) у лиц старше 2-х лет. Вакцинация особенно показана лицам из числа групп риска :

- старше 65 лет (в первую очередь - постоянно находящимся в специальных учреждениях по уходу за престарелыми);
- ослабленным или часто госпитализируемым (больным диабетом, хроническими бронхитами, дыхательной и сердечной недостаточностью); лицам, имеющим алкогольную или табачную зависимость;
- лицам с ослабленной иммунной системой (перенесшим спленэктомию, страдающим серповидноклеточной анемией, имеющим нефротический синдром);
- лицам с подтеканием спинномозговой жидкости.

Противопоказания

Данный препарат НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ в следующих случаях:

- повышенная температура тела;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения.

В этом случае вакцинацию следует отложить:

- аллергическая реакция на предшествовавшую прививку пневмококковой вакциной;
- первые два триместра беременности (за исключением тех случаев, когда врач считает, что вакцинация показана).

Использование данной вакцины не рекомендуется у лиц, проходивших противопневмококковую вакцинацию в течение предыдущих 3 лет (за исключением случаев особых показаний). Перенесенная пневмококковая инфекция (независимо от достоверности диагноза) не является противопоказанием к вакцинации, которая назначается при риске инфицирования.

Предостережения

В сомнительных случаях проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.

Лекарственные взаимодействия

Не установлены какие-либо взаимодействия с другими медицинскими препаратами. Для того, чтобы избежать возможных взаимодействий между различными медицинскими препаратами, сообщайте врачу о любом лечении, совпадающем по времени с вакцинацией.

Беременность и грудное вскармливание

Использование данного препарата возможно только в последнем триместре беременности и только по рекомендации врача. Вакцинация может быть проведена в период грудного вскармливания. Перед вакцинацией в период беременности или

грудного вскармливания рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Дозировка

Первичная иммунизация: однократная инъекция 0,5 мл. Ревакцинация: однократная инъекция 0,5 мл (рекомендуется проводить не чаще, чем с интервалом в 3 года).

Способ применения

Внутримышечные или подкожные инъекции.

Строго следуйте предписаниям Вашего врача.

Побочные реакции

Как и любой биологически активный препарат, данная вакцина может вызывать у некоторых пациентов побочные реакции различной степени выраженности:

- Болезненность, покраснение, уплотнение или припухлость в месте инъекции. Данные реакции носят умеренный характер и быстро проходят.
- В редких случаях возможно развитие тяжелых местных реакций (типа феномена Артюса), имеющих обратимый характер и проходящих без каких-либо последствий.

Как правило, данные реакции развиваются у лиц с высоким уровнем противопневмококковых антител.

Умеренное повышение температуры тела (редко превышающее 39С). Как правило, температура возникает в день прививки и сохраняется не более 24 часов после вакцинации.

В очень редких случаях возможно развитие других общих реакций – аденопатии, сыпи, артралгии и аллергических реакций (крапивница, отек Квинке, анафилактическая реакция).

Сообщайте врачу обо всех случаях необычных побочных реакций, не перечисленных в данной инструкции.