

Живая аттенуированная вирусная вакцина для профилактики краснухи. (ШТАММ WISTAR RA 27/3M)

**Форма выпуска**

Суспензия для инъекций, получаемая путем растворения лиофилизата прилагаемым растворителем:

- Флакон, содержащий 1 дозу лиофилизированной вакцины + шприц с растворителем (0,5 мл).
- Флакон, содержащий 10 доз лиофилизированной вакцины + флакон с растворителем (5 мл).

**Показания**

Данный препарат является вакциной и рекомендуется для профилактики краснухи у детей, независимо от пола, начиная с 12-месячного возраста. Вакцинацию рекомендуется проводить у девушек препубертатного возраста и серонегативных женщин детородного возраста.

**Противопоказания**

Не использовать препарат в следующих случаях:

- Беременность;

Проинформируйте Вашего врача, если Вы находитесь на ранней стадии беременности.

- Врожденные или приобретенные иммунодефициты (включая ВИЧ-инфекцию);
- Недавнее введение иммуноглобулинов или любого деривата крови, содержащего иммуноглобулины.

**Дети, рожденные от ВИЧ-позитивных матерей**

Проникновение материнских антител класса IgG через плаценту делает невозможным определение серологического статуса ребенка до 9-10-месячного возраста (присутствие материнских антител обнаруживалось до 14 месяцев). По этой причине, прежде, чем сделать вывод о том, что ребенок не инфицирован, необходимо дождаться, пока он станет серонегативным. С этой целью проводится анализ с помощью иммуноэлектрофореза, а также (в случае необходимости) технологии определения вирусного генома.

1. Если ребенок не инфицирован: вакцинация проводится в соответствии с обычной схемой.
2. Если ребенок инфицирован: решение о вакцинации принимает специализированный консилиум.

В любом сомнительном случае проконсультируйтесь со специалистом.

**Предостережения**

Вакцинация женщины пубертатного возраста проводится при условии, что женщина не

беременна на момент вакцинации и не планирует беременность в течение следующих за вакцинацией 2-х месяцев. В любом сомнительном случае проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Лекарственные взаимодействия**

Во избежание возможных взаимодействий с некоторыми медицинскими препаратами, сообщите Вашему врачу или фармацевту обо всех видах лечения, совпадающих по времени с вакцинацией данным препаратом.

**Схема применения и режим дозирования**

Вакцина вводится подкожно или внутримышечно путем однократной инъекции. Плановая вакцинация или ревакцинация краснухи рекомендуется у девочек в препубертатном возрасте (11-13 лет). Во всех случаях строго следуйте предписаниям врача.

**Побочные реакции**

Как и любой биологически активный препарат, данная вакцина может вызывать у некоторых пациентов следующие побочные реакции различной степени выраженности:

- кожная сыпь в виде мелких розеол или фиолетовых пятен различного размера. У детей вакцинация переносится очень хорошо.

У взрослых могут отмечаться:

- боль в суставах;
- увеличение лимфатических узлов.

В более редких случаях возможны кожная сыпь и незначительное повышение температуры тела. Сообщайте Вашему врачу или фармацевту обо всех побочных реакциях, не описанных в настоящей инструкции.