

Полисахаридная вакцина для профилактики брюшного тифа.

Показания

Профилактика брюшного тифа у взрослых и детей старше 5 лет, в частности - у лиц, отправляющихся в эндемичные регионы, у медицинского персонала и у военных.

Дети младше 5 лет:

- дети младшего возраста крайне редко болеют брюшным тифом, в связи с этим детей младше 2 лет вакцинировать не рекомендуется;
- для решения вопроса о вакцинации детей в возрасте от 2 до 5 лет необходимо проконсультироваться с врачом.

Данная вакцина создана на основе компонентов (капсулярный антиген) возбудителя брюшного тифа.

Специфический иммунитет развивается через 2-3 недели после вакцинации.

Иммунитет сохраняется в течение, как минимум, трех лет.

Противопоказания

Вакцина не должна вводиться пациентам с документированной гиперчувствительностью к какому-либо из компонентов вакцины.

Беременность: необходимо проконсультироваться с врачом.

Предостережения

При повышенной температуре тела или инфекционном заболевании вакцинацию следует отложить.

В затруднительных случаях необходимо проконсультироваться с врачом.

Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Дозировка и способ введения

Вакцинацию проводят одной дозой вакцины, однократно.

Ревакцинацию проводят через 3 года.

Вакцину вводят подкожно или внутримышечно.

Побочные реакции

В течение 24 часов после вакцинации часто наблюдается незначительная болезненность в месте инъекции. В более редких случаях возможны покраснение или уплотнение в месте инъекции. В 1% - 5% случаев возможно незначительное повышение температуры тела.